Information pour les pêcheurs de ruisseaux et de rivières

Les jeunes **ouananiches** et ombles de fontaine (truites mouchetées) cohabitent dans les rivières du bassin versant du Grand lac Saint-François.

Voici comment les différencier

Ouananiche
Tacon



Taille jusqu'à 8 po

Photo : Stephen D. McCormick

- 1. Queue fourchue.
- 2. Absence de marques sur la nageoire dorsale.
- 3. Points noirs sur l'opercule.
- 4. Bouche plus petite qui ne dépasse pas l'œil.

Truitelle

Photo : Dave Neely (NANFA)

- 1. Queue droite ou peu fourchue.
- 2. Nageoire dorsale marbrée de noir.
- 3. Absence de points noirs sur l'opercule.
- 4. Bouche plus grande qui dépasse l'œil.
- 5. Lignes blanches sur les nageoires abdominales.

La taille de 6-8 po (15-20 cm) atteinte, le tacon prend une coloration argentée.

Si vous capturez une ouananiche (tacon)

- ✓ Mouillez vos mains et évitez de toucher aux branchies ou aux yeux du poisson.
- ✓ Retirez délicatement l'hameçon ou coupez-le s'il est trop profondément engagé.
- ✓ Maintenez le poisson dans l'eau et relâchez-le doucement lorsqu'il commence à s'agiter.

Dans la zone de pêche 4 :
La remise à l'eau des ouananiches de moins de 16 ½ po (42cm) est obligatoire.
La limite de prise et possession est de 2.

L'APGLSF a parmi ses objectifs celui de maintenir, augmenter et protéger la ressource.

Ces informations et photos nous sont fournies par la CBJC (Corporation du bassin de la Jacques-Cartier)

CBJC « une ressource pour le milieu »

FQSA

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE — CANADIAN WILDLIFE FEDERATION

APGLSF
Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François

Web : apglsf.com

SOS Braconnage 1-800-463-2191 Courriel : centralesos@mffp.gouv.qc.ca